

Avertissements agricoles

Publication périodique

EDITION "GRANDES CULTURES"

ISSN 0757 4029

BULLETIN TECHNIQUE N° 25

6 OCTOBRE 1989

COLZA : Vol d'Altises depuis le 25 Septembre. Quelques présences éparses de Pucerons, de Tenthredes et de Vers gris.

CEREALES A PAILLE : Ralentissement du vol de Pucerons, mais ceux-ci restent très virulifères.

- C O L Z A -

Deux types de situations :

- 1) Semis de la deuxième quinzaine d'Août, à levée homogène et actuellement au stade "4-5 feuilles".
- 2) Semis de Septembre, à levée hétérogène et dont les stades s'échelonnent de "la graine non germée" à "3 feuilles vraies".

GROSSES ALTISES :

* Un vol assez généralisé a démarré à partir du 25 Septembre sur tous les départements de la région. L'intensité du vol varie fortement selon les conditions locales.

* Dans certains cas cette année, des dégâts sont observés malgré un piégeage nul (mauvaise représentativité de la cuvette). Une surveillance des plantes est donc nécessaire.

* Quelques exemples de piégeages cumulés réalisés depuis le 25 Septembre :

DEPARTEMENT	COMMUNE	CAPTURES CUMULEES	DERNIER STADE CULTURE OBSERVE
18	MERY ES BOIS	14	B2 - B3
36	AVAIL	0	B5
36	VELLES	0	B4
37	MONNAIE	10	B2 - B3
37	REUGNY	5	B2
45	LE CHESNOY	14	B3

—> Si votre colza n'a pas dépassé le stade B2 et si vous observez des **morsures nutritionnelles** sur plus de 3 plantes/10 (perforations de cotylédones ou de feuilles), un traitement rapide est conseillé.

—> Si votre colza a dépassé le stade "2 feuilles vraies" (B2), il n'est plus sensible aux dégâts directs d'Altises adultes. Par contre, un traitement de nettoyage sera à envisager pour empêcher les infestations larvaires dans les pétioles cet hiver dès que vous aurez piégé plus de 20 à 30 Altises en cumulé.

Ce cas n'est encore pas observé dans la région à ce jour.

Produits utilisables : voir liste sur bulletin N° 23 du 15 Septembre 1989 en page 1.

Abonnement annuel : 170 F - Chèque à l'ordre du Régisseur de Recettes

à envoyer à l'adresse ci-dessous.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, Rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX - Tél. (38) 86.36.24

EDITION DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES "CENTRE"

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)



P 41

PUCERONS :

* Une arrivée de **Pucerons cendrés** et de **Pucerons verts** est signalée sur quelques cultures éparses. Des adultes ailés sont encore en cours d'arrivée, et quelques colonies sont visibles sur les plantes les plus développées des parcelles.

* Ces pucerons ne sont redoutables que dans des parcelles à vitesse de croissance lente pour cause de sécheresse et sur des cultures n'ayant pas atteint le stade "3-4 feuilles".

—> Malgré la faible pluviométrie actuelle, les plantes de colza levées ne semblent pas trop souffrir de la sécheresse et sont parfaitement turgescentes. Un traitement ne semble donc jamais justifié pour l'instant. A surveiller dans les 15 jours à venir, surtout si la sécheresse actuelle persiste.

TENTHREDES :

* Dans quelques parcelles de Champagne Berrichonne, une présence de larves de **Tenthrede de la rave** est signalée. Celles-ci, de couleur gris foncé avec deux bandes noires sur le dos, ressemblent à des chenilles et se laissent tomber de la plante dès qu'elle sont dérangées.

* Elles occasionnent des dégâts pouvant être confondus avec ceux de limaces (tissu foliaire rongé en respectant un épiderme) et sont très voraces, pouvant provoquer une défoliation complète des plantes dès qu'elles ont acquis une taille suffisante.

—> En cas d'attaque sévère, une destruction peut être envisagée indifféremment avec l'un des produits insecticides utilisables sur colza à l'automne (pyréthrinoïdes, parathion, phosalone, endosulfan, etc...).

VERS GRIS :

* Quelques nouveaux cas nous ont été signalés depuis une semaine (Berry-Puisaye du Loiret, Champagne Berrichonne de l'Indre : secteur d'Issoudun).

—> Voir bulletin N° 23 du 15 Septembre 1989. En cas d'intervention la nuit par pulvérisation, utiliser de préférence de forts litrages de bouillie (500 à 1000 litres d'eau à l'hectare).

- C E R E A L E S A P A I L L E -

DESHERBAGE D'AUTOMNE :

* Le désherbage de prélevée ou de post-levée très précoce (1 à 3 feuilles) est la solution la mieux adaptée pour les **semis précoces de céréales** (Octobre), surtout si les parcelles sont régulièrement envahies par les mauvaises herbes et si la portance des sols en fin d'hiver est mauvaise.

* Le traitement en prélevée est un **traitement d'assurance**, ce qui suppose une bonne connaissance de la flore habituelle de la parcelle. La post-levée précoce permet une intervention mieux ciblée sur levées visibles.

* Les avantages des applications de prélevée ou de post-levée précoce sont :

- interventions en bonnes conditions,
- élimination précoce de la concurrence,
- possibilité de traitement complémentaire en cas de mauvaise efficacité ponctuelle,
- grande période de récupération de la culture en cas de phytotoxicité.

* Dans tous les cas, la réussite du désherbage d'automne dépend des facteurs suivants :

- - lit de semences bien préparé (pas trop de mottes ni de résidus végétaux en surface),
- sol ni trop humide (risque de lessivage) ni trop sec (risque d'inefficacité),
- dose à adapter au type de sol (forte en sol argileux, faible en sol sableux filtrant),
- choix des produits en fonction des sensibilités variétales : attention aux variétés sensibles au chlortoluron.

—> Pour le choix du ou des produits, se reporter au dépliant vert ITCF joint au bulletin N° 24 du 22 Septembre 1989.

Remarques importantes :

- Pour les produits de prélevée à base d'urées substituées, bien contrôler la profondeur de semis. En effet, en cas de semis trop profond et de gel avant